Colistine buvable Virbac
Solution buvable, antibiotique
Composition :
Colistine(UI).....200 000 000 (sous forme de sulfate)
Alcool benzyliques (ml).....1
Excipient (ml)q.s.p.....100
Indications :
Affections à germes sensibles à la colistine, chez les veaux, agneaux et volailles.
MODE D'EMPLOI-POSOLOGIE :
Veaux et agneaux : 50 000 UI par kg de poids vif, soit 0.25 ml par 10 kg de poids vif matin et soir pendant 3 à 4 jours, à mélanger soit à l'eau de boisson, soit à l'aliment d'allaitement.
Volailles : 75 000UI par kg de poids de vif et par jour, soit environ 0,25 ml par litre d'eau de

boisson pendant 3 jours.
PRECAUTION D'UTILISATION :
Ne pas prolonger l'utilisation au-delà de 4 jours consécutifs (risque de néphrotoxicité).
DELAI D'ATTENTE :
Viande et abats : 7 jours.
Œufs : nul.
A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant la durée du temps d'attente.
Fabriqué par VIRBAC S.A. –France
Conditionné par VETOPHARM PRO 144 Z.I. « Le Rhumel » 25000 CONSTANTINE - ALGERIE